

PROTOCOLO SUGERIDO PARA SIEMBRA Y FERTILIZACIÓN DE MAIZ

RECOMENDACIONES DE SIEMBRA:

Densidad de siembra:

- 1,3 bolsas de 60.000 semillas para 1 hectárea (78.000 semillas)
Entre Surcos 80 CM
Entre Plantas 16 CM
Una semilla por hueco a una profundidad máxima de 2 CM (o el doble del tamaño de la semilla)
- 1 bolsa de 60.000 semillas para 1 hectárea
Entre surcos 80 CM
Entre plantas 20 – 25 cm
Una semilla por hueco a una profundidad máxima de 2 cm (o el doble del tamaño de la semilla)

TRATAMIENTO DE SEMILLA

1 sachet de TROPIRIZHOFLO de 100 CC se diluye en 100 CC de agua y se aplica con un atomizador sobre la semilla antes de la siembra. (1 sachet por bolsa de semilla por hectárea)

CONTROL GUSANO TROZADOR

Al momento de germinación de la semilla (aproximadamente entre el 3er y 5to día de sembrado) aplicar:

RAFAGA 500 cc para la caneca de 200 litros se realiza sobre la planta y si hay necesidad repetir al 3er o 4to día seguido de la primera aplicación.

FERTILIZACIÓN EDÁFICA

PRIMERA Aplicación a la siembra

Dosis por hectárea

3 Bultos Abono KCL Granulado (Cloruro de Potasio) * 50 kilos

4 Bultos YOORIN (Termo fosfato) * 40 kilos

1 Bultos Agrimins Polvo (Elementos Menores) * 46 kilos

(Aproximadamente 4,6 gramos por planta)

SEGUNDA Aplicación (15 días después de la 1ra aplicación)

Dosis por hectárea

2 Bultos Abono KCL Granulado (Cloruro de Potasio) * 50 kilos

4 Bultos Abono UREA * 50 kilos

(Aproximadamente 3,8 gramos por planta)

TERCERA Aplicación (15 días después de la 2da aplicación)

Dosis por hectárea

4 Bultos Abono UREA * 50 kilos

(Aproximadamente 2,5 gramos por planta)

FERTILIZACIÓN FOLIAR Y CONTROL GUSANO COGOLLERO

PRIMERA Aplicación

Cuando la planta presente la 4 hoja verdadera (aproximadamente a los 20 días después de la siembra)

Dosis por hectárea:

TROPICALCIS ALGAE 1 Litro

TROPICALCIS INICIO 1 Litro

YELMOLA 50 EC (LUFENURON) 200 ml

Aplicación foliar realizar un buen empape a toda la planta

SEGUNDA Aplicación

Cuando la planta presente la 8 hoja verdadera (15 días después de la 1ra aplicación)

Dosis por hectárea

TROPICALCIS ALGAE 1 Litro

TROPICALCIS MIZ 1 Kilogramo

TROPICALCIS COMBI 250 gramos

ZENZOL 50 EC (LAMBDA CYHALOTRINA) 500 ml

Aplicación foliar realizar un buen empape a toda la planta

TERCERA Aplicación cuando la planta presente la 10 - 12 hoja verdadera (15 días después de la 2da aplicación)

Dosis por hectárea

TROPICALCIS DEFENDER K 1 Litro

TROPICALCIS NPK 1 Litro

ZENZOL 50 EC (LAMBDA CYHALOTRINA) 500 ml

Aplicación foliar realizar un buen empape a toda la planta

CONTROL DE MALEZAS POST-EMERGENTE

Cuando la planta presente la 4 hoja verdadera (aproximadamente a los 15 días después de germinado cuando el maíz este a la altura de la rodilla)

Dosis por hectárea

ATRAZINA Kilogramo (Control de gramíneas malezas de hojas angostas)

DUBLON GOLD (NICOSULFURON & THIFENSULFURON-METHY) 50 gramos (Control de malezas de hojas anchas) Dirigir principalmente a las calles